

# Tratamento

O tratamento da artrite reativa, também conhecida como doença de Reiter, visa aliviar os sintomas e tratar a causa subjacente, frequentemente uma infecção bacteriana, como clamídia ou gastroenterite. O manejo inclui anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) para controlar a inflamação e reduzir a dor. Em casos mais graves ou persistentes, corticosteroides podem ser prescritos. O tratamento da infecção subjacente é essencial, e antibióticos podem ser indicados se uma infecção persistente for identificada. A abordagem terapêutica é adaptada às necessidades individuais, e a supervisão médica é crucial para monitorar a resposta ao tratamento e ajustá-lo conforme necessário.

## PELA SUA SAÚDE:

**1. LEIA AS INFORMAÇÕES  
DAS EMBALAGENS DOS MEDICAMENTOS.**

**2. SIGA AS INSTRUÇÕES  
DO SEU MÉDICO  
OU FARMACÊUTICO.**



**Horário de Assistência Farmacêutica:**

Segunda à Sexta  
das 07h às 17h

**Para maiores Informações procure o  
Farmacêutico.**



Comissão de Atenção Farmacêutica  
Farmácia do Componente Especializado da  
Assistência Farmacêutica  
SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento  
da Medicina  
**2025**

Farmácia de Medicamentos Especializados  
SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

## COMISSÃO DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA

## DOENÇA DE REITER



# Introdução

A artrite reativa, também conhecida como doença de Reiter, é uma condição reumática que se manifesta como artrite, uretrite e conjuntivite. Geralmente, surge como uma resposta do sistema imunológico a uma infecção bacteriana, como clamídia ou gastroenterite. Os sintomas incluem inflamação das articulações, desconforto ao urinar e irritação ocular. O tratamento envolve o controle dos sintomas com anti-inflamatórios não esteroides e, quando apropriado, o tratamento da infecção subjacente com antibióticos. A gestão da doença requer avaliação médica para adaptação de abordagens terapêuticas conforme necessário.

# Causas

A artrite reativa, ou doença de Reiter, tem sua origem frequentemente associada a infecções bacterianas, especialmente por clamídia e gastroenterite causada por certas cepas de bactérias, como *Salmonella*, *Shigella*, *Yersinia* e *Campylobacter*. Essa condição é desencadeada pelo sistema imunológico como resposta à infecção, resultando em uma reação autoimune que afeta as articulações, os olhos e o trato urinário. Fatores genéticos também podem desempenhar um papel na predisposição à artrite reativa.



# Sintomas

A artrite reativa, ou doença de Reiter, apresenta sintomas característicos que incluem inflamação das articulações, uretrite (inflamação da uretra) e conjuntivite (inflamação dos olhos). Os pacientes podem experimentar dor, inchaço e rigidez nas articulações, desconforto ao urinar e irritação nos olhos. Além disso, manifestações extra-articulares como lesões na pele e mucosas, bem como inflamação em outros órgãos, podem ocorrer. A presença desses sintomas, especialmente após uma infecção bacteriana, sugere a necessidade de avaliação médica para diagnóstico e tratamento apropriados.