

# Tratamento

- O objetivo do tratamento é a preservação do órgão doador com o uso de medicamentos imunossupressores.

- Disponível na Farmácia de Alto Custo:

Micofenolato de mofetila 500mg,  
Micofenolato sódio 180 e 360mg,

Azatioprina 50mg, Ciclosporina  
25mg, 50mg e 100mg e Solução  
oral, Imunoglobulina humana 2,5g e  
5,0g, Tacrolimo 1mg e 5mg, Everolimo  
0,5mg, 0,75mg e 1mg, Sirolimo  
1mg e 2mg.

## PELA SUA SAÚDE:

### 1. LEIA AS INFORMAÇÕES

DAS EMBALAGENS DOS  
MEDICAMENTOS.



### 2. SIGA AS INSTRUÇÕES

DO SEU MÉDICO  
OU FARMACÊUTICO.



Horário de Assistência Farmacêutica:

Segunda à Sexta  
das 07h00 às 17h00

Para maiores Informações procure o  
Farmacêutico.



Comissão de Atenção Farmacêutica  
Farmácia do Componente Especializado da Assistência  
Farmacêutica  
SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da  
Medicina  
2025

Farmácia de Medicamentos Especializados

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

## COMISSÃO DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA

## Imunossupressão no transplante Renal



# Introdução

Imunossupressão no transplante renal são medicamentos que são utilizados para prevenção das rejeições agudas ou crônicas de pacientes transplantados.

O tratamento se baseia no objetivo de inibir o reconhecimento e a ativação da resposta alogênica celular e humoral e é dividido em 2 fases:

- Indução (Administração de doses elevadas);
- Manutenção (prevenção da rejeição).



# Causas

- Perda da função renal;
- Problema genético / hereditário;
- Diabetes;
- Hipertensão
- Obesidade.



Orientações pós - transplante:

Jamais tomar qualquer medicação que não tenha sido prescrita;

Levar sempre a sua última receita;

Manter sempre as medicações em suas embalagens originais;

Aprender os nomes dos medicamentos e saber para que eles servem;

Não guardar os frascos ou caixas vazias ou com prazo de validade vencido;

Não trocar os medicamentos de caixa e tampouco juntá-los com outros;

Caso surjam efeitos imprevistos como vômitos, urticária, dor de cabeça, dor de estômago, anotá-los e informar imediatamente o médico.